

जीरा फसल की खेती पद्धति

भूमि	अच्छी जल निकासी वाली रेतीली, दोमट और मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त होती है।
बुआई का समय	नवंबर का पहला पखवाड़ा
बीज कि.ग्रा./ हेक्टर	10-12
रोपण दूरी (सेमी)	दो पंक्तियों के बीच 30 सेमी.
भूमि की तैयारी	हैरो या देशी हल से 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह जोत लिया जाता है। पिछली फसल के डंठलों को इकट्ठा करके खेत से हटा देना चाहिए।
बीजोपचार	सेरेसन या थायरम या डेफोल्टन @ 3 ग्राम प्रति किग्रा की दर से उपचार करें।
बुआई की विधि	बीजों को पंक्तियों में या छिड़काव द्वारा बोया जा सकता है।
जैविक खाद्य (टन/हेक्टर)	15 टन गोबर का खाद
रासायनिक खाद्य (कि.ग्रा./ हेक्टर)	कुल:- 40:15:00 (एन.पी.के.) आधार में:- 13.5:15:00 (एन.पी.के.) पूर्ति:- 26.5 कि.ग्रा. नाइट्रोजन (बुवाई के 8वें से 10वें और 30वें दिन दो बराबर किस्तों में)
पिपत	जीरे को 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फुल आने के बाद सिंचाई ना करे
निराई	जीरे की फसल को 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। आवश्यकतानुसार 25-30 और 40 दिन दो बार निराई करे। बुवाई के बाद अंकुरण से पहले नमीवाली मिट्टी पर पेंडीमेथालिन 1 किग्रा/हेक्टर का समान रूप से छिड़काव करें।
रोग नियंत्रण	काला: उच्च आर्द्रता वाली फसलों के आसपास बुवाई न करें। छोटे और सपाट क्यारी बनाये। जब फसल 45 दिन की हो जाए तो 35 ग्राम मैन्कोजेब 75 डब्ल्यूपी को 10 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 4 बार छिड़काव करें।
कीट नियंत्रण	मोलोमाशी:- 10 मिली मिथाइल-ओ-डाइमैथोएट या 10 मिली डाइमैथोएट को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जेसीड:- 10 मिली मिथाइल-ओ-डिमेटोन या 10 मिली थायोमिडोन को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
कटाई	जीरे की फसल 105 से 110 दिनों में पक जाती है। बीजों को खराब होने से बचाने के लिए ओस के सूखने से पहले या सुबह के समय कटाई कर लें। कटाई के बाद, पौधों को एकत्र किया जाता है। एक साफ और कठोर खलिहान में लाया जाता है, दो से तीन दिनों तक सुखाया जाता है, और साफ करने के लिए एक छड़ी या थ्रेसर की मदद से दाने को अलग किया जाता है।

જીરુ પાકની ખેતી પધ્ધતિ

જમીન	સારા નિતારવાળી રેતાળ, ગોરાડુ, અને મધ્યમ કાળી જમીન માફક આવે છે
વાવણી સમય	નવેમ્બરનું પ્રથમ પખવાડિયું
બીજ દર કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર	૧૦-૧૨
રોપણી અંતર (સે.મી.)	બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી.,
જમીન ની તૈયારી	હેરો અથવા દેશી હળ વડે ૨-૩ ખેડાણ કરીને માટીને સારી રીતે ખેડવામાં આવે છે. પાછલા પાકના થડ એકઠા કરીને ખેતરમાંથી દૂર કરવા જોઈએ.
બીજ માવજત	સેરેસન અથવા થાયરમ અથવા ડિફોલ્ટન @ ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલોગ્રામ સાથે સારવાર.
વાવણી પધ્ધતિ	બીજને હારમાં અથવા છાંટીને વાવેતર કરી શકાય
સેન્દ્રિય ખાતર (ટન/હેક્ટર)	૧૫ ટન છાણીયું ખાતર
રસાયણિક ખાતર (કિ.ગ્રા./હેક્ટર)	કુલ:- ૪૦:૧૫:૦૦ (એન.પી.કે) પાયામાં:- ૧૩.૫:૧૫:૦૦ (એન.પી.કે) પુત્તી:- ૨૬.૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (વાવણીના ૮ થી ૧૦ અને ૩૦ દિવસે બે સરખા હપ્તામાં)
પિયત	જીરુમાં ૪-૫ પિયતની જરૂર પડે છે
નિંદાણ	જીરુના પાકને ૪૫ દિવસ સુધી નિંદાણમુક્ત રાખવો જરૂરી છે. ૨૫-૩૦ અને ૪૦ દિવસે એમ બે વાર જરૂર મુજબ નિંદાણ કરવું. પેન્ડીમીથાલીન ૧ કિગ્રા/હે વાવણી બાદ ઉગતા પેહલા ભેજયુક્ત જમીનમાં એકસરખો છંટકાવ કરવો.
રોગ નિયંત્રણ	ચરમી/કાળીયો:- વધુ ભેજવાળા પાકી આજુબાજુ વાવવા નહિ. ક્યારા નાના અને સમતલ બનાવવા. પાક ૪૫ દિવસનો થાય એટલે મેન્કોઝેબ ૭૫ ડબ્લ્યુપી ૩૫ ગ્રામ પતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગળીને ૧૦ દિવસના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવા.
જવાત નિયંત્રણ	મોલોમશી:- ૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦ મિલી મીથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન અથવા ડાયમીથોએટ ૧૦ મિલી પ્રમાણે ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
કાપણી / લણણી	તડતડીયા:- ૧૦ લીટર પાણીમાં મીથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મિલી અથવા થાયોમીડોન ૧૦ મિલી પ્રમાણે ભેળવીને છંટકાવ કરવો. જીરુનો પાક ૧૦૫ થી ૧૧૦ દિવસે પરિપક્વ થાય છે. દાણા ખરી ના જાય તે માટે કાપણી ઝાકળ ઉડી જાય તે પહેલા અથવા સવારના સમય માં કરવી. કાપણી કર્યા પછી છોડ એકત્ર કરી સ્વચ્છ તથા કઠણ ખળામાં લાવી બે થી ત્રણ દિવસ સુકવીને લાકડીની મદદથી અથવા શ્રેસરથી દાણા છુટા પાડી ઉપાણી સાફ કરવા.